


Integration spezieller und zusammengesetzter Funktionen

von Dr. Jürgen Leitz



© Imgorthand/E+/Getty Images

In diesem Buch lernen die Schüler zunächst verkettete Funktionen und damit auch die Kettenregel der Differentialrechnung neu kennen. Anschließend wiederholen sie zum Einstieg die Integralrechnung Integrale von elementaren Funktionen. Danach erarbeiten sich die Lernenden durch zielgerichtete Aufgaben Integrationsformeln für spezielle (zusammengesetzte) Funktionen. Diese Formeln, sowie die partielle Integration wenden sie schließlich an komplexeren Integralen an. Als Hilfestellung dazu enthält der Beitrag eine kleine Formelsammlung spezieller Integrationen sowie Beschreibungen von bewährten Methoden der partiellen Integration.

Impressum

RAABE UNTERRICHTS-MATERIALIEN Analysis Sek. II

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Es ist gemäß § 60b UrhG hergestellt und ausschließlich zur Veranschaulichung des Unterrichts und des Lehres an Bildungseinrichtungen bestimmt. Die Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH erteilt Ihnen für den Fall, dass das einfache, nicht übertragbare Recht zur Nutzung für den persönlichen Gebrauch gemäß vorgenannter Zweckbestimmung unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen sind Sie berechtigt, das Werk zum persönlichen Gebrauch gemäß vorgenannter Zweckbestimmung in Klassensatzstärke zu vervielfältigen. Jede darüber hinausgehende Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Hinweis zu §§ 60a, 60b UrhG: Das Werk oder Teile hiervon dürfen nicht ohne eine solche Einwilligung an Schulen oder in Unternehmen und Lehrmedien (§ 60b Abs. 3 UrhG) vervielfältigt, insbesondere kopiert oder eingescannt, verbreitet oder in einer sonst öffentlich zugänglichen Weise eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht oder wiedergegeben werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Die Aufführung abgedruckter musikalischer Werke ist ggf. GEMA-meldepflichtig.

Für jedes Material wurden Fremdrechte recherchiert und ggf. angefragt.

Dr. Josef Raabe Verlag GmbH
Ein Unternehmen der Kleinfachgruppe
Rotebühlstraße 77
70178 Stuttgart
Telefon +49 711 62900-0
Fax +49 711 62900-60
meinRAABE@raabe.de
www.raabe.de

Redaktion: Irene Dick
Satz: RÖDER MEDIA GmbH & Co. KG, Karlsruhe
Bildnachweis Titel: Imgorhand/E+/Getty Images
Illustrationen: Oliver Wetterauer
Korrektur: Wona Hitzeneauer

Zur Wiederholung:

1. Verkettung von Funktionen

Verkettung von Funktionen

Zwei Funktionen f und g können durch Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division zu einer neuen Funktion zusammengesetzt werden.

Des Weiteren gibt es neben diesen Verknüpfungen noch die Verkettung von Funktionen (auch Komposition oder Hintereinanderausführung genannt).

Bekannt ist eine solche Verkettung zweier Funktionen im Zusammenhang mit der Kettenregel und hierbei ebenso die Begriffe äußere und innere Funktion.

Definition:

Gegeben seien die beiden Funktionen f und g . Für die Verkettung dieser beiden Funktionen wird eine besondere Schreibweise verwendet:

$$f(g(x)) = (f \circ g)(x)$$

(gelesen: f „von“ g von x , f „verkettet mit“ g von x)

$f \circ g$ heißt die Verkettung von f mit g , wobei die Funktion g als innere Funktion und die Funktion f als äußere Funktion bezeichnet wird.

Voraussetzung einer solchen Verkettung ist, dass die Wertemenge von g eine Teilmenge der Definitionsmenge von f ist.

„ \circ “ ist das Zeichen für die Operation der Verknüpfung.

Die verketteten Funktionen werden von rechts nach links bzw. von innen nach außen „ausgewertet“.

Bemerkung: Die Reihenfolge der Verkettung ist wichtig, da im Allgemeinen die Kommutativität nicht gilt: $f \circ g \neq g \circ f$ (siehe Beispiel 1).

Beispiel 1:

Mit $f(x) = 7 \cdot x$ und $g(x) = x + 2$

$$\Rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x)) = 7 \cdot (x+2) = 7 \cdot x + 14$$

$$\Rightarrow (g \circ f)(x) = g(f(x)) = 7 \cdot x + 2$$

also $f \circ g \neq g \circ f$

Beispiel 2:

Mit $f(x) = x^2$ und $g(x) = x + 2$

$$\Rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x)) = (x+2)^2 = x^2 + 4 \cdot x + 4$$

$$\Rightarrow (g \circ f)(x) = g(f(x)) = x^2 + 2$$

Beispiel 3:

Mit $f(x) = \sin x$ und $g(x) = e^x$

$$\Rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sin(e^x)$$

$$\Rightarrow (g \circ f)(x) = g(f(x)) = e^{\sin x}$$

Beispiel 4:

Äußere und innere Funktion in $(f \circ g)(x) = e^{3 \cdot x + 2}$ bestimmen:

z. B.: äußere Funktion: $f(x) = e^x$

z. B.: innere Funktion: $g(x) = 3 \cdot x + 2$

Beispiel 5:

Wie lauten äußere und innere Funktion in $(f \circ g)(x) = \sqrt{3 \cdot x + 5}$?

äußere Funktion: $f(x) = \sqrt{x}$ innere Funktion: $g(x) = 3 \cdot x + 5$.

Hinweis: Die Lösung ist nicht eindeutig, es gibt mehrere Möglichkeiten der Verkettung, z. B. auch: äußere Funktion: $f(x) = \sqrt{x+5}$

innere Funktion: $g(x) = 3 \cdot x$.

Aufgaben zur Verkettung von Funktionen

1. Bestimmen Sie für folgende Funktionen f und g jeweils den Funktionsterm der Verkettung

a) $f(x) = x^2$ und $g(x) = 2 \cdot x + 3$

b) $f(x) = \sin x$ und $g(x) = 3 \cdot x + 1$

c) $f(x) = e^x$ und $g(x) = 2 \cdot x^2 - 1$

d) $f(x) = x^2$ und $g(x) = \cos x$

e) $f(x) = \sqrt{3 \cdot x + 1}$ und $g(x) = 2 \cdot x^2 + 3$

f) $f(x) = \frac{1}{x}$ und $g(x) = x^2 + 3$

g) $f(x) = x^2$ und $g(x) = e^x$

h) $f(x) = 3 \cdot x + 4$ und $g(x) = x^2$

2. Geben Sie für folgende verkettete Funktionen jeweils eine möglich äußere und innere Funktion an.

a) $(f \circ g)(x) = (2 \cdot x - 3)^5$

b) $(f \circ g)(x) = 2 \cdot \sin(5 \cdot x)$

c) $(f \circ g)(x) = \sqrt[3]{x^2 + 4}$

d) $(f \circ g)(x) = \frac{3}{5 \cdot x - 3}$

e) $(f \circ g)(x) = e^{x^2 + 1}$

f) $(f \circ g)(x) = \frac{2}{x^2 + 3}$

g) $(f \circ g)(x) = 5 \cdot x^2 - 7$

h) $(f \circ g)(x) = 2 \cdot x + 2$

Der RAABE Webshop: Schnell, übersichtlich, sicher!



Wir bieten Ihnen:



Schnelle und intuitive Produktsuche



Übersichtliches Kundenkonto



Komfortable Nutzung über
Computer, Tablet und Smartphone



Höhere Sicherheit durch
SSL-Verschlüsselung

Mehr unter: www.raabe.de